

Instructiekaarten DairyNet

Inhoudsopgave


Melk separeren wegens antibiotica	2
Speenspecifieke instellingen.....	4
Afkalving invoeren	6
Inseminatie invoeren	7
Drachtstatus aanpassen	8
Droogzetting invoeren.....	9
Groepswissel.....	10
Dier aanvoeren.....	12
Dier afvoeren.....	14
Monstername	16



Melk separeren wegens antibiotica

Indien melk gesepareerd moet worden vanwege biest, voer dan een afkalving in

Druk in de bovenste balk op [Kudde](#) en vervolgens [Runderen](#).



Klik op de balk van het dier waarvan de melk gesepareerd moet worden, nu opent de dierdata.

Diertype	Diernummer	Naam	Status	Melkgroep	Controle	Lact.nr.	LDAG	7-daags gem. (melk in kg)	Voergroep	Stalgroep	Levensnummer	Ras	Inactief
Koe	65	MAITJE 31	Drachtig	Automatische Melkgroep		2	351	27,02 kg	Lactatie 2+	Stal		HF	Nee
Koe	66	BOELENS 433	Vroeg	Automatische Melkgroep		1	29	41,13 kg	Lactatie 1	Stal		HF	Nee
Koe	67	FLORA 246	Drachtig	Automatische Melkgroep		4	303	39,22 kg	Lactatie 2+	Stal		HF	Nee
Koe	69	HEIDEROOS 607	Drachtig	Automatische Melkgroep		1	202	41,73 kg	Lactatie 1	Stal		HF	Nee

Klik vervolgens op het tabblad [Uierinstellingen](#). Klik links op het [Plusje](#) achter separeren wegens antibiotica.



Vul de gewenste separatie instellingen in.

×

Separeren wegens antibiotica

van

Datum

Uur

▼

Minuut

▼

☒ start nu

t/m

Datum

Uur

▼

Minuut

▼

☒ Onbeperkt

Boxreinigingstype*

Spelen

▼

Melkleiding*

uit melkinstellingen

▼

Ok

Annuleren

Druk op [Ok](#) en vervolgens op [Opslaan](#) om de melkseparatie op te slaan.

i

7 - NL 123456789 - GERRITJE 110

✓ Opslaan

Annuleren

×

<

Dierdata

Responder/Diergroepen

Fokkerij

Journal

Uierinstellingen

DairyRobot

Melkingen

Dagproductie

>

Separatie

Separeren wegens biest

Geen separatieperiode ingesteld

+

Separeren wegens antibiotica (gewijzigd)

van

nu (wordt actief onmiddellijk na opslaan)

t/m

Onbeperkt

Boxreinigingstype

Spelen

Melkleiding

uit melkinstellingen

Wachttijd vlees

Geen separatieperiode ingesteld

+

Bekijk ingestelde separatie

Verwijder uiercoördinaten

Zichtbaarheid spenen

Zichtbaarheid LV*

Standaard

▼

Zichtbaarheid RV*

Standaard

▼

Zichtbaarheid LA*

Standaard

▼

Zichtbaarheid RA*

Standaard

▼

GEA

van A naar B(eter) melken

3

Speenspecifieke instellingen

Druk in de bovenste balk op [Kudde](#) en vervolgens [Runderen](#).



Klik op de balk van het dier waarvoor speenspecifieke instellingen moet worden ingesteld.

Diertype	Diernummer	Naam	Status	Melkgroep	Controle	Lact.nr.	LDAG	7-daags gem. (melk in kg)	Voergroep	Stal	Levensnummer	Ras	Inactief
☐ Koe	65	MAITJE 31	Drachtig	Automatische Melkgroep	○○○○○	2	351	27,02 kg	Lactatie 2+	Stal		HF	Nee
☐ Koe	66	BOELENS 433	Vroeg	Automatische Melkgroep	○○○○○	1	29	41,13 kg	Lactatie 1	Stal		HF	Nee
☐ Koe	67	FLORA 246	Drachtig	Automatische Melkgroep	○○○○○	4	303	39,22 kg	Lactatie 2+	Stal		HF	Nee
☐ Koe	69	HEIDEROOS 607	Drachtig	Automatische Melkgroep	○○○○○	1	202	41,73 kg	Lactatie 1	Stal		HF	Nee



Klik vervolgens op het tabblad [Uierinstellingen](#). Onder de kopjes [Zichtbaarheid Spenen](#) en [Speen instellingen](#) kunnen speenspecifieke instellingen worden ingesteld.

7 - NL 123456789 - GERRITJE 110

✓ Opslaan
Annuleren

Dierdata
Responder/Diergroepen
Fokkerij
Journaal
Uierinstellingen
DairyRot

Separatie

Separeren wegens biest
Geen separatieperiode ingesteld

+

Zichtbaarheid LV*
Standaard

Separeren wegens antibiotica
Geen separatieperiode ingesteld

+

Zichtbaarheid RV*
Standaard

Wachttijd vlees
Geen separatieperiode ingesteld

+

Zichtbaarheid LA (gewijzigd) *
Onzichtbaar - niet melken

Zichtbaarheid RA*
Standaard

Bekijk ingestelde separatie

Verwijder uiercoördinaten


Speen instellingen

Speen	Ontbrekende melkstroom negeren	Separatie	Niet melken
LV	☐	☐	☐
RV	☐	☐	☐
LA	☒ (gewijzigd)	☐	☒ (gewijzigd)
RA	☐	☐	☐


Druk op [Opslaan](#) om de wijzigingen op te slaan.

Afkalving invoeren


Druk in de bovenste balk op [Reproductie](#) en vervolgens op [Afkalven](#).



Toets bij het diernummer het diernummer in van de koe die heeft gekalfd en druk op [Toevoegen](#).



Vul vervolgens de gegevens over de afkalving en het geboren kalf in. Extra kalveren kunnen worden toegevoegd door op [+ Kalf toevoegen](#) te klikken. Standaard wordt één kalf al weergegeven.




! Let op: Controleer of de melk-, voer- en stalgroep goed staan bij het dier!

Druk op [Boeken](#) om de afkalving op te slaan.




Inseminatie invoeren


Druk in de bovenste balk op [Reproductie](#) en vervolgens op [Inseminatie](#).



Toets bij diernummer het diernummer in van het dier dat geïnsemineerd is en druk op [Toevoegen](#).



Vul vervolgens het inseminatietype in en de dekstier, en daarbij de overige inseminatiegegevens.




Druk op [Boeken](#) om de inseminatie op te slaan.




Drachtstatus aanpassen


Druk in de bovenste balk op [Reproductie](#) en vervolgens op [Drachtstatus](#).



Toets bij diernummer het diernummer in van het dier waarvan de drachtstatus moet worden aangepast en druk op [Toevoegen](#).



Vul vervolgens bij een positieve dracht bij [Drachtig?](#) → "Ja" in en controleer de [Inseminatie van](#) gegevens.




Vul bij een negatieve dracht bij [Drachtig?](#) → "Nee" in en kies de juiste [Nieuwe status](#). "Gust" of "Niet insemineren" bij een dier dat bewust gust gelaten wordt.

Druk op [Boeken](#) om de drachtstatus op te slaan.




Droogzetting invoeren


Druk in de bovenste balk op [Reproductie](#) en vervolgens op [Droogzetten](#).



Toets bij diernummer het diernummer in van het dier dat drooggezet is en druk op [Toevoegen](#).



Vul vervolgens de droogzetdatum, controleer de betreffende inseminatie en vul de melk-, voer- en stalgroep bij de droogstand in.



Druk op [Boeken](#) om de droogzetting op te slaan.




Groepswissel

Druk in de bovenste balk op [Kudde](#) en vervolgens op [Groepswissel](#).



Selecteer de dieren waarvoor een groepswissel ingevoerd moet worden. Dit kan door op de gewenste dieren aan te vinken of de diernummers in te typen bij [Selectie met diernummers](#). Druk vervolgens op [Selecteren](#).



Selecteer de gewenste melk-, stal- en voergroep van het dier/de dieren door op het potloodje te drukken onder de aan te passen groep.

(Bij geen invoer van een nieuwe groep, blijft de huidige groep behouden)

Wanneer er meerdere dieren geselecteerd zijn, kan met de [pijltjes](#) tussen de verschillende dieren gebladerd worden en per dier de nieuwe groepen ingevuld worden. Zijn de nieuwe groepen voor alle geselecteerde dieren hetzelfde, dan kan na het invullen van de nieuwe groepen van een dier op [Toepassen op alle](#) worden gedrukt.

Druk tenslotte op [Boeken](#) om de groepswissel op te slaan.



Dier aanvoeren

Druk in de bovenste balk op [Kudde](#) en vervolgens op [Aanvoer](#).



Vul hier de gegevens in. In het tweede tabblad [Geboorte/fokkerij](#) kunnen geboorte- en fokkerijgegevens van het dier worden ingevuld.

Aanvoer

Actiedatum: 28-07-2025

Boeken Plannen Opslaan

1 1 0

Diergegevens **Geboorte/fokkerij**

Diertype *		Naam	
Ras		Gezondheidsstatus *	Gezond
Geslacht *			
Levensnummer *			
Diernummer			
Responder 1			
Responder 2			
Aanvoertype			
Gebruik			
Bedrijf/-locatie *			
Vorige eigenaar			
Melkgroep			
Voergroep			
Stalgroep			




Aanvoer

Boeken

Plannen

Opslaan

Annuleren

Boeken

Actiedatum 28-07-2025



 1

1

0

Diergegevens
Geboorte/fokkerij

Geboorte info

Moeder

Vader
Geboortedatum
Geboortetype
Geboortegewicht (kg)
Geboorteverloop

Relatieve fokwaarden

Totale fokwaarde

Kg melk
Vruchtbaarheid
Exterieur
Levensduur
Melkbaarheid
Melkgedrag

Fokwaarden

Melk (kg)

Vet (kg)
Eiwit (kg)
Vet%
Eiwit%

Personen


Commentaar

Druk tenslotte op [Boeken](#) om de aanvoer van het dier op te slaan.





Dier afvoeren

Druk in de bovenste balk op [Kudde](#) en vervolgens op [Afvoer](#).



Selecteer de af te voeren dieren. Dit kan door (1) het diernummer in te typen en op de knop Toevoegen te klikken, of (2) op de knop Toevoegen te klikken en de gewenste dieren aan te vinken of de diernummers in te typen bij [Selectie met diernummers](#). Druk vervolgens op [Selecteren](#).



Vul de afvoergegevens in.

DairyNet Dashboard Mijn menu **Kudde** Melken Reproductie Gezondheid Voeren

Afvoer

Dieren (2)

- 7 - GERRITJE 110 Koe
- 9 - JOSIA 68 Koe

7 - GERRITJE 110

Actiedatum*	Afnehmer *	Afvoertype	Afvoerreden	Personen
28-07-2025				
Commentaar				

9 - JOSIA 68

Actiedatum*	Afnehmer *	Afvoertype	Afvoerreden	Personen
28-07-2025				
Commentaar				

9 - JOSIA 68

Lactaties
1

Aantal lactatiedagen
201

Huidige status
Geïnsemineerd

Wachtijd vlees
Nee

Zijn de afvoergegevens voor alle geselecteerde dieren hetzelfde, dan kan na het invullen van de afvoergegevens van een dier op [Toepassen op alle](#) worden gedrukt.

Druk tenslotte op [Boeken](#) om de Afvoer op te slaan.



Monstername

Vorbereiding monstername in DairyNet

1. Klik op [Melken](#) en vervolgens op [Vorbereiden monstername DairyRobot](#)



2. Vul de gegevens voor de monstername in. De instellingen uit onderstaande afbeelding kunnen worden overgenomen. De tijd van de monstername wordt automatisch ingevuld.


Betreffende dieren > Hele kudde ; Aantal monsters > 1
 Runderen met separatie wegens antibiotica/biest uitsluiten > vinkje aan
 Betreffende DairyRobots > Alles selecteren

3. Druk op [Planning aanmaken](#) in de rechterbovenhoek
4. De monsternamekoffer en monsternamebeker kan nu worden aangesloten en de monstername kan worden gestart in MView.




CRV bestand maken na monstername

1. Open de map Monstername op het bureaublad.
2. Open de CRV Adapter.



3. Druk op [←] rechtsbovenin om in te loggen.



4. De inloggegevens zijn al automatisch ingevuld er hoeft enkel op OK geklikt te worden om een verbinding tot stand te brengen.
5. Een aantal algemene parameters worden getoond, deze hoeven niet gewijzigd te worden. Druk rechtsonder op verder.
6. Selecteer vervolgens aan de linkerzijde de juiste locatie en de juiste testdagen (datum) van de monstername.
7. Klik op [Laad melkbezoeken](#). Alle melkingen sinds de laatste monstername worden nu geladen.
8. Druk tenslotte rechtsonder op [Aanmaken en bewaren](#).
9. Druk om het bestand op te slaan op bureaublad aan de linkerzijde en open vervolgens de map Monstername aan de rechterzijde. Sla het bestand in deze map op.
10. Verstuur het monstername bestand vervolgens naar de organisatie die de monstername verwerkt met vermelding van het UBN nummer.

Organisatie	E-mailadres
CRV	robotbestand@crv4all.com
VVB IJsselstreek	Hielke@vvbveluwe-ijsselstreek.nl
VVB Silvolde	info@vvbsilvolde.nl
VVB Nijland	info@melkcontrollenijland.nl
FHRS	info@fhers.nl

